

UNIDAD DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA Sala de Endoscopia planta -1

Dr. Manuel Villapún N°. col. 43121 Dr. Javier Aranda N° col. 59868 Dr. José Antonio Pajares N° col. 58749



INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN DE COLONOSCOPIA CON CLENSIA (CN 714093.1)

1) ATENCIÓN A LOS MEDICAMENTOS QUE TOMA HABITUALMENTE:

- Consulte con su médico la necesidad de retirar **ANTIAGREGANTES**, como **ácido acetilsalicílico** (Aspirina®, Adiro®, Bioplak®, Tromalyt®, Trinomia®) y **clopidogrel** (Iscover®, Plavix®).
- Si toma ANTICOAGULANTES como Sintrom[®] Lixiana[®], Pradaxa[®], Xarelto[®] o Eliquis[®] es necesario suspender su
 toma 3 días antes de la colonoscopia (la última dosis la tiene que tomar 72 horas antes de la prueba). Y en algunos
 casos habrá que sustituirlos por heparina, para lo cual debe ponerse en contacto con su hematólogo o médico. El día
 de la colonoscopia se le indicará cuándo volver a tomarlo.
- Si toma preparados de HIERRO es necesario suspenderlos desde 1 semana antes de la colonoscopia.
- Si toma **MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES**, suspéndalos a partir de la última comida sólida previa a la limpieza intestinal, hasta después de realizada la colonoscopia.
- Si está en tratamiento con **INSULINA** es preferible que le citen la exploración a primera hora de la mañana o de la tarde y puede ser necesario, debido a las modificaciones en la dieta, reducir las dosis de insulina previas a la colonoscopia (consulte con su médico).
- Si toma ANTIEPILÉPTICOS y medicamentos para ASMA O EPOC, no los interrumpa a no ser que se le indique lo contrario.

2) EL DÍA DE LA EXPLORACIÓN:

- No se olvide de leer y llevar consigo la hoja del **consentimiento informado**, que deberá firmar antes de realizar la exploración y su **volante de prescripción autorizado** por su Compañía.
- Deberá acudir acompañado de una persona que se responsabilice de su traslado al domicilio una vez realizada la
 prueba ya que probablemente se le administrará medicación (un analgésico y un sedante) que afecta a los reflejos y a
 la capacidad de juicio, por lo que no podrá conducir las siguientes horas a la exploración ni volver sólo a su domicilio.
- Informe al personal de endoscopias que le va a realizar la exploración sobre cualquier enfermedad importante que padezca, alergias y medicamentos que toma habitualmente.
- · Consulte a su médico si tiene dudas con otros medicamentos que tome y no se mencionen en este texto

DIETA PARA LA COLONOSCOPIA

3 días antes de la exploración iniciará una dieta sin fibra. Puede consumir los siguientes alimentos:

PUEDE TOMAR: Arroz blanco, pasta no integral, caldos, carnes sin grasa a la plancha, pescado blanco o hervido o a la plancha, quesos duros, jamón o pavo cocido, puré de patata y lácteos desnatados (también leche), biscotes no integrales, galletas sin fibra, zumos colados sin pulpa, infusiones, agua, café (sin leche ni nata), bebidas sin burbujas.

NO PUEDE TOMAR: Ensaladas, verduras y hortalizas, legumbres, todo tipo de fruta, patatas, carne y pescados en salsa, embutidos, frutos secos, leche, grasas, bollería y pasteles, chocolate, alcohol y bebidas con burbujas.



No se debe tomar ningún medicamento oral en la hora siguiente a la administración de la solución Clensia, ya que podría eliminarse sin ser absorbido.

Su cita es el día	
de,	
a lashoras	





UNIDAD DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA Sala de Endoscopia planta -1

Dr. Manuel Villapún Nº. col. 43121 Dr. Javier Aranda Nº col. 59868 Dr. José Antonio Pajares Nº col. 58749



PREPARACIÓN PARA LA COLONOSCOPIA CON






Preparación por toma:



Disolver 2 sobres grandes (A) y 2 sobres pequeños (B) en 1 litro de agua en cada toma.



Preparar al menos 500 ml de líquido claro como agua o té (sin leche) por cada toma de 1 litro de solución de Clensia.



Tome 250 ml (aprox. 1 vaso) de solución de Clensia cada 15 - 20 minutos hasta terminar el litro de preparado Clensia. Se recomienda tomar frío. A continuación, beba, al menos, 500 ml de líquido claro como agua, jugos claros sin pulpa o té (sin leche).



En todos los casos (colonoscopia por la mañana o por la tarde) para asegurar una correcta limpieza del colon (sus deposiciones serán con aspecto de líquido claro o transparente) trate de ingerir toda la preparación y abundante líauido.

Recuerde no tomar nada (ni agua) 4 horas antes de la prueba.

desde el inicio de la toma de Clensia!

Si le surgieran dudas, puede contactar de lunes a viernes, preferentemente con Irene: 600585707 (de 10:00h. a 13:00h. o Dr. Villapún: 679457191 (de 9:00h. a 20:00h.)



